



## Øjenbrynsløft - direkte

Med alderen synker øjenbrynene ned. Det resulterer i løs hud og tyngdefornemmelse svarende til øvre øjenlåg. I sværere tilfælde kan det medføre indskrænket synsfelt. De fleste kompenserer for dette ved et løft øjenbrynene, hvilket ofte medfører udtrætning af pandemuskulaturen og hovedpine.

Øjenbrynene kan løftes ved at skære et bådformet hudstykke af lige over øjenbrynene, så arret kommer til at ligge i øjenbrynskanten. Øjenbrynene bliver fikseret i den ønskede position.

Arret vil, hvis patienten har en vis mængde hår i øjenbrynet, blive næsten usynligt med tiden.

Hos patienter med dybe tværgående panderynker, kan snittet placeres i en rynke. Herefter kan øjenbrynene løftes og overskud af hud fjernes.

Operation: foretages i lokalbedøvelse og tager ca. 1½ time.

Sygemelding: 1 uge

Let motion kan optages efter 1-2 uger

## Mulige risici og komplikationer

Der kan opstå hævelse og misfarvning af øjenlåg 1-2 uger, og synet kan være sløret i første døgn.

Der kan opleves hovedpine i et par døgn.

Der er en beskedent risiko for påvirkning af pandemusklens og midlertidig følelsesløshed i huden omkring arret i op til 6 måneder.

Arrene kan blive fortykkede og kan behandles med Fraxel laser for at blive næsten usynlige.

## Varighed af resultat

Resultatet er stabilt efter ca. 3 måneder og påvirkes af de naturlige ældningsprocesser.