



Reduktion eller korrektion af øreflip

Reduktion af store og/eller lange øreflipper eller korrektion af øreflipper pga. større ørepiercinger eller kløftet øreflip ønskes oftest pga. kosmetiske eller fysiske gener. Mindre og kortere øreflipper giver bedre harmoni i ansigtet.

Der findes forskellige teknikker til reduktion af øreflipper eller korrektion af huller fra piercinger. Teknikken afhænger af ørets facon og størrelse af øreflipperne samt tilstedeværelse af naturlige folder, hvor plastikkirurgen så vidt muligt skjuler arrene. Det kan i visse tilfælde være nødvendigt at anvender teknikker, som giver ar på undersiden eller forsiden af øreflippen.

Efter operationen påsættes plaster (3M Micropore).

Operation: foregår i lokalbedøvelse og varer ca. 1 time.

Patienten kan gå hjem umiddelbart efter operationen.

Sygemelding: 1-2 dage

Let motion kan genoptages efter 1 uge

Mulige risici og komplikationer

Misfarvning: Misfarvninger er normale og vil forsvinde af sig selv efter 2-3 uger.

Blødning: Risikoen for blødning efter operation er minimal.

Infektion: Infektion er sjælden og kan om nødvendigt behandles med antibiotika.

Følelsesløshed: Følelsesforstyrrelser på øreflippen er normale i det første uger, men forsvinder over nogle måneder.

Ar: Er synlige de første måneder, men bleger normalt af inden for et år.

Øreringe: Der kan skydes nye huller i ørerne efter 3 måneder. Øreringe i eksisterende huller må anvendes, når sårene er helede og sårskorperne er væk.