



Fedtknuder

Introduktion

Fedtknuder er godartede forandringer bestående af fedtvæv omgivet af en meget tynd kapsel.

Fedtknuder ligger sædvanligvis i underhuden omgivet af det almindelige underhudsfedt, men de kan også sidde fast på, eller ligge inde mellem musklerne.

Fjernelse af en fedtknude ønskes oftest pga. kosmetiske eller fysiske gener.

Operation

Operationen foregår i lokalbedøvelse. Der placeres et passende snit over fedtknuden. Det tilstræbes en total fjernelse af fedtknuden, for at undgå at den kommer tilbage senere på samme sted.

Store enkelte fedtknuder eller fedtknuder med dyb vækst bliver altid sendt til undersøgelse under mikroskop for at udelukke ondartet forandring. Store fedtknuder >5 cm i størrelse skal skannes med ultralyd eller MR inden evt. operation.

Pleje efter operation

Belastning, bøjning og tunge løft skal helst undgås den første tid efter operationen.

Undgå sport eller lignende i 2-3 uger.

Undgå sol på arrene i det første års tid, brug solcreme.

Tråde vil almindeligvis blive fjernet efter 1-2 uger.

Mulige bivirkninger og risici

Der er en lille risiko for blødning, infektion eller misfarvning.

Ved at beskytte arret mod sollys forhindres pigment forandring.

Forventet resultat

Ofte er resultatet permanent med forbedring af kosmetiske og evt. fysiske gener.

Der vil dog altid være en mindre risiko for udvikling af en ny fedtknude samme sted eller i nærheden.